



MIGTRACKER

SAISON 2025 - 2026
O. TRECA - T. VERDIER



MIGTRACKER

Nous nous retrouvons pour analyser la saison **2025/26**, saison complète suivie jour après jour par Migtracker, de l'ouverture sur le DPM jusqu'au 31 janvier. Les **17 380** nouvelles nuits viennent enrichir une base qui atteint désormais près de **140 000** enregistrements. Qui l'eut cru lors du démarrage de cette aventure ?

Par son volume, sa continuité et sa couverture géographique, cette base est un **outil unique** pour analyser les migrations dans le temps et dans l'espace.

En recueillant **des informations de jour comme de nuit**, Migtracker permet également d'étudier les mouvements nocturnes, largement absents des comptages réalisés uniquement en journée.

Plus la participation progressera, plus les analyses régionales et nationales gagneront en précision.

Nous vous souhaitons, Thierry et moi, une excellente saison 2026/27.



Une saison rythmée par quelques belles périodes, dont un passage de Noël exceptionnel !

La saison 2025/26 par rapport aux années précédentes

Après trois saisons consécutives de baisse, la saison 2025/26 marque un net rebond. Avec 1,67 pose en moyenne par nuit et par installation, elle se classe au deuxième rang des dix dernières saisons, derrière 2021/22 et ses 1,74 pose.

Ce résultat, supérieur de près de 30 % à celui de 2024/25, confirme une saison globalement favorable malgré des passages très irréguliers.

Heureusement que Décembre nous a apporté du froid car la saison aurait été assez triste quand même. Il faut s'en réjouir !

MIGTRACKER - Comment participer ?

Le processus est très simple et permet de faire progresser notre connaissance de la migration.

Rendez vous sur le site www.migtracker.com ! Vous créez votre compte, vos installations et saisissez vos nuits, en toute confidentialité. Vous avez vos statistiques au fur et à mesure et pouvez même associer une photo à chaque nuit enregistrée.

Chaque enregistrement va donner lieu à une ou plusieurs réponses par mail dans la journée avec le récapitulatif de toutes les données recueillies.

www.migtracker.com






La saison 2025/26

Le déroulement du passage

Évolution quotidienne des poses moyennes — saison 2025/26

Les zones orangées correspondent aux principales périodes de passage détectées.



Entre le 1er août 2025 et le 31 janvier 2026, la migration n'a pas suivi un rythme régulier. Plusieurs vagues courtes ont animé l'automne, avant un épisode majeur entre Noël et le Nouvel An. Au total, 28 nuits ont dépassé le seuil statistique de mouvement et 8 périodes de migration importante ont été identifiées.

- **Août** -> Les deux ouvertures sont très moyennes
- **Septembre** -> Très bon mois avec 2 pics, l'un en début de mois et l'autre, assez important, toute la dernière décade ou presque
- **Octobre** -> Très calme avec un seul pic de migration, en milieu de mois.
- **Novembre** -> Un peu mieux qu'octobre mais avec seulement 2 pics dont un assez brutal les 16 et 17 avec en particulier les souchets.
- **Décembre** -> Mois très calme jusqu'à Noël mais feu d'artifice ensuite.
- **Janvier** -> Le meilleur mois de l'année avec le prolongement du mouvement de la fin d'année jusqu'au 10 et un dernier mouvement le 25 janvier

Les chiffres clés

184	Nuits analysées
28	Nuits au dessus du seuil de mouvement
8	épisodes migratoires
2,6	Seuil statistique de mouvement



Le Chasseur de Migrateurs


MIGTRACKER

SAISON 2025-2026
O. TRECA - T. VERDIER

Les facteurs favorisant le passage

Les conditions associées aux bonnes nuits

Le vent est le facteur le plus constant ; en hiver, le froid devient puissant lorsqu'une fenêtre de vent s'ouvre.



Lecture descriptive : associations observées sur la saison 2025/26, sans attribution causale automatique.



L'analyse météo pour la saison 2025/26 montre que le **vent portant**, vers 700 à 800 mètres d'altitude, est le facteur le plus régulier de la saison. Avant décembre, les mouvements apparaissent surtout lorsque **plusieurs zones de départ disposent simultanément d'un vent favorable**. Une faible nébulosité améliore également les conditions, mais son influence reste secondaire.


À partir de décembre, la **température devient beaucoup plus importante**. Une T° minimale inférieure à -5 °C sur le corridor continental constitue un véritable signal de poussée. Ce seuil ne suffit toutefois pas à lui seul : **lorsque le froid est accompagné d'un vent portant** dans au moins quatre zones, 60 % des nuits dépassent le seuil de mouvement, contre 17 % dans les autres situations.

L'épaisseur de neige n'a pas montré d'effet indépendant sur cette seule saison. De même, la lune et l'éclairage nocturne ne semblent pas déclencher les mouvements une fois le vent, la température et la nébulosité pris en compte.

Les zones de départ favorables sur la saison 2025/26

Un axe dominant du nord-est de l'Europe vers la France

L'influence la plus forte se concentre sur Wadden - Danemark - Elbe - Oder, puis se diffuse vers le sud-ouest.



Le signal le plus cohérent provient du corridor continental formé par la **mer des Wadden**, le **Danemark**, l'**Allemagne** du Nord et la frontière **Pologne-Allemagne**. Ces zones ont souvent bénéficié simultanément de vents favorables orientés vers la France.

Le **sud de l'Allemagne** et le secteur du **lac du Der** apparaissent comme des influences hivernales secondaires. À l'inverse, l'Est de l'**Angleterre** et l'estuaire de la **Tamise** n'ont pas produit de signal déterminant durant la saison 2025/26. L'Angleterre deviendrait-elle une zone d'hivernage et non de départ ?



MIGTRACKER

SAISON 2025-2026
O. TRECA - T. VERDIER




La saison 2025/26

Les espèces

Dix saisons d'évolution des poses moyennes par espèce

Courbe bleue : valeurs annuelles | Tirets colorés : tendance linéaire indicative | Point ocre : 2025/26.



Échelles propres à chaque espèce | Moyenne simple des dix axes Migtracker

La **saison 2025/26** se distingue par une très forte présence de la sarcelle d'hiver et par une nouvelle progression du souchet. À l'inverse, le colvert atteint son niveau le plus faible de la série. Les autres espèces présentent des évolutions plus modérées ou plus difficiles à interpréter.

La **sarcelle d'hiver** est la grande gagnante de la saison. Le nombre moyen de poses par nuit progresse de 53 % par rapport aux neuf saisons précédentes et atteint le niveau le plus élevé de la série. Le nombre moyen d'oiseaux posés augmente lui aussi d'environ 40 %.

Le **souchet** confirme une tendance globalement favorable, avec 28 % de poses supplémentaires et près de 30 % d'oiseaux posés en plus. Le **chipeau** progresse plus modérément en fréquence de poses, environ 10 %, mais la hausse du nombre d'oiseaux posés atteint 26 %.

Le **siffleur** reste très proche de sa moyenne historique : la fréquence des poses recule légèrement de 3 %, tandis que le nombre d'oiseaux posés demeure stable.

Le **pilet** termine environ 11 % sous sa moyenne des neuf saisons précédentes.

Le **colvert** constitue le principal point faible de la saison. La fréquence moyenne des poses baisse de 35 % et le nombre d'oiseaux posés d'environ 40 %. Il s'agit du niveau le plus faible observé sur les dix saisons présentées. Les hécatombes dues au botulisme sont peut-être une des causes de cette diminution.

Le **milouin** recule d'environ 20 % et le **morillon** de 36 %. Les **oies cendrées et rieuses**, ainsi que la **sarcelle d'été**, se situent également sous leurs moyennes historiques.

Ces espèces génèrent toutefois beaucoup moins de poses dans la base Migtracker ; leurs variations doivent donc être interprétées avec davantage de prudence.

Saison 2025/26 CONCLUSION

Merci à tous les contributeurs Migtracker.

Chaque nuit renseignée améliore notre capacité à suivre les mouvements et à comprendre les différences entre espèces et régions. Les données individuelles restent confidentielles et ne sont jamais publiées nominativement : seules des **synthèses agrégées et non nominatives sont communiquées**, comme celle que vous avez sous les yeux.

Au final, la saison 2025/26 restera comme une **saison favorable**, mais très irrégulière. Son niveau moyen, le deuxième plus élevé des dix dernières années, repose davantage sur quelques fenêtres migratoires marquées. Le passage de la Noël, prolongé jusqu'au début janvier, en constitue incontestablement le temps fort. Il fallait y être.

L'analyse des facteurs favorisant de la saison 2025/26 confirme le **rôle central des vents portants** sur le corridor continental Oder → France. En hiver, le froid devient un déclencheur lorsque les températures minimales descendent sous -5°C , à condition qu'un vent favorable accompagne cette baisse.

Les espèces présentent également des trajectoires contrastées : **la sarcelle d'hiver et le souchet continuent leur progression**, tandis que le colvert, le morillon et le milouin restent en retrait. Ces résultats ne constituent pas une estimation des populations, mais une photographie solide des mouvements observés sur les installations contributrices. La profondeur acquise par Migtracker permettra d'en suivre l'évolution saison après saison.



Thierry et moi vous souhaitons une excellente saison 2026/27 !